

CRISIS CONVULSIVA



SÍNTOMAS

- Pérdida de conocimiento.
- Movimientos de brazos y piernas (pueden ser muy variados y afectar a diferentes partes del cuerpo).
- Rigidez de tronco y/o extremidades.
- Otros: labios morados, espuma por la boca, emisión de orina, ojos vueltos hacia arriba.

QUÉ HACER

- Llamar al 112 y a la familia.
- Colocar en la posición lateral de seguridad.
- Desabrochar las prendas justas.
- Mantener la calma y tranquilizar a los de alrededor.
- TRATAR SI ESTÁ INDICADO (en niño epiléptico conocido, y con informe)

STESOLID
intrarrectal



BUCCOLAM
con atomizador
intranasal o
bucal

- Comprobar la temperatura y contar el tiempo que dura la crisis.

QUÉ NO HACER

- Dejarle sólo.
- Intentar meter algo en la boca.
- Darle de beber o echar agua en la cara.
- Agarrarlo con fuerza.
- Tratar de despertarlo.



KONBULTSIO-KRISIA



SINTOMAK ...

- Konortea galtzea.
- Beso eta hanka mugimenduak (oso ezberdinak izan daitezke eta gorputz-atal ezberdinei eragin).
- Gorputz-enborraren eta/edo gorputz-adarren zurruntasuna.
- Ezpain moreak, ahotik bitsa, ahotik adurra botatzea, txiza egitea, begiak goraka iraultzea.

ZEREGIN ...

- 112ra eta familiari deitu.
- Segurtasuneko albo baterako posizioan jarri.
- Arropa estua askatu.
- Lasaitasunari eutsi eta ingurukoak lasaitu.
- TRATATU ADIERAZITA BADAGO (haur epileptiko ezaguna, eta txostenarekin).

STESOLID
ipurdian



BUCCOLAM
sudurreko edo
ahoko atomiza-
gailuarekin

- Temperatura zaindu eta krisiak irauten duen denbora neurtu.

ZEREZEGIN ...

- Bakarrik utzi.
- Ahoan zerbait sartzen saiatu.
- Edatekoa eman edo aurpegian ura bota.
- Indarrez eutsi.
- Esnatzen saiatu.

