


CRISIS DE ASMA




SÍNTOMAS ...

Tos, dificultad respiratoria, pitidos, voz entrecortada, sensación de falta de aire, opresión en el pecho.

DISNEA



OPRESIÓN TORÁCICA




SIBILANCIAS



TOS



QUÉ HACER ...



TRATAMIENTO CRISIS ASMÁTICA

Administrar SALBUTAMOL con cámara 2-4 inhalaciones (siempre de una en una, separadas por 10 seg.) que se pueden repetir, si se precisa, cada 20 minutos hasta un máximo de 12 inhalaciones.

VALORAR PASADA 1 HORA



ESTÁ MEJOR

Menos tos y menos dificultad respiratoria

Salbutamol con cámara 2-4 inhalaciones cada 4 horas.



ESTÁ PEOR

Más pitido y mayor dificultad respiratoria

Continuar con el tratamiento y acudir al médico de urgencias.

Avisar a la familia.


ASMA KRISIA




SINTOMAK ...

Eztula, arnasteko zailtasuna, txistu-hotsak, bularreko estutasuna.


DISNEA



ZAPALKUNTZA
TORAZIKOA




SIBILANTZIA



EZTULA



ZEREGIN ...



TRATAMIENTO CRISIS ASMÁTICA

Eman 2-4 SALBUTAMOL dosi kamerarekin (banaka, 10 segundu bereizita). 20 minuturo errepika daiteke (behar bada) 12 dosi gehienez emanaz.

ORDU BAT PASA ONDOREN EBALUATU



HOBETO DAGO

Eztul esta arnas hartzeko zailtasun gutxiago

Salbutamol con cámara 2-4 inhalaciones cada 4 horas.



OKERRAGO DAGO

Txistu-hotsak gehiago eta arnas hartzeko zailtasun handiago

Continuar con el tratamiento y acudir al médico de urgencias.

Familiari deitu.