

DIABETES HIPOGLUCEMIA

(menos de 70 mg / dl)



★ SIGNOS INICIALES DE HIPOGLUCEMIA ...

- Sensación de hambre
- Dolor de cabeza
- Sudoración fría
- Cambio de carácter
- Temblores
- Dolor abdominal



★ SI NO SE TRATA (y sigue bajando la glucosa) ...

- Dificultad para pensar o hablar
- Visión borrosa
- Adormecimiento
- Mareos
- Comportamiento extraño (agresividad)




★ SI SIGUE BAJANDO ...

- Pérdida de conciencia
- Convulsiones y coma

★ QUÉ HACER ...

- Si está consciente: dar 2 terrones de azúcar o zumo de fruta. Cuando mejore, ofrecer pan, galletas o pieza de fruta.
- Si está inconsciente: administrar GLUCAGON IM (pautado individualmente)
- Colocar en posición lateral de seguridad.
- Llamar al 112 y a la familia



Miel: una cucharada.



Bebida azucarada: 150 ml.



Zumo: 150 ml.



Azúcar: 15 gramos.



★ QUÉ NO HACER ...

- Dejarle solo

DIABETESA

HIPOGLUZEMIA

(> 70 mg / dl)



★ HIPOGLUZEMIAREN LEHEN SEINALEAK ...

- Gose sentipena
- Buruko mina
- Izerdi hotza
- Izaera aldaketa
- Dardara
- Sabeleko mina



★ EZBADATRATATZEN (eta glukosak jeisten jarraitzen badu) ...

- Pentsatzeko edo hitz egiteko zailtasuna
- Ikusmen lausoa
- Logura
- Zorabioak
- Portaera arraroa (oldarkortasuna)



★ JAISTEN JARRITZEN BADU ...

- Konortea galtzea
- Konbultsioak eta koma

★ ZEREGIN ...

- Konortea badu: bi azukre koskor edo fruta zukua eman. Onera egiten duenean ogia, galletak edo fruta-ale bat eskaini.
- Konortetik gabe badago: muskulu-barneko GLUCAGON eman (banaka arautua).
- Segurtasuneko albo baterako posizioan jarri.
- 112ra eta familiari deitu.



★ ZEREZEGIN ...

- Bakarrik utzi